

Cytisus emeriflorus Rchb.

(*Fabaceae*)
Citisio insubrico



Endemismo insubrico ad areale esteso dal Lago di Lugano al lago di Como; a est presenta una disgiunzione sulle Prealpi Carniche

Il genere *Cytisus* deriva il suo nome dal greco “kytiso”, nome dato dai greci alla *Medicago arborea* e scelto da Linneo per questo genere per le foglie trifogliate.

Habitat: popola depositi clastici, pascoli aridi rupestri, boschi termofili su substrati calcarei del piano collinare e montano, spingendosi fino a quello subalpino (200-1800 m). Raggiunge l'optimum in cenosi boschive del *Fraxino orni-Pinetum nigrae*.

Descrizione: è un arbusto alto 20-60 cm. Ha fusto legnoso per breve tratto e consistenza erbacea nella parte superiore (suffrutice). Le foglie hanno un picciolo di 10-15 mm, sono ternate, a segmenti ellittici od obovati, glabri e verdi di sopra, sericeo-pubescenti di sotto.

Ha fiori lunghi 10-15 mm, peduncoli lunghi altrettanto, portati in fascetti di 2-4; corolla giallo oro con vessillo (10-12 mm) striato di rosso.

Il frutto è un legume lineare (2,5-4 x 4-8 mm), glabro.

Fiorisce da maggio a giugno.